outsphera for life

ITLS International Trauma Life Support

# VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

## VALUTAZIONE DELLA SCENA

- precauzioni standard
- pericoli sulla scena
- numero di pazienti
- necessità di ulteriore aiuto / attrezzature
- meccanismo di lesione

## VALUTAZIONE INIZIALE

- impressione generale del paziente
- livello di coscienza
- c-ABC
  - **c** - controllo emorragie maggiori
  - **A** - Vie aeree
  - **B** - Respiro
  - **C** - Circolo - Colorito cutaneo

## MECCANISMO DI LESIONE

generalizzato o sconosciuto → VALUTAZIONE RAPIDA DEL TRAUMA

localizzato → ESAME FOCALIZZATO

(Valutazione Primaria ITLS)

## Paziente Critico (Load & Go)

no → VALUTAZIONE SECONDARIA ITLS

si → RIVALUTAZIONE

## VALUTAZIONE SECONDARIA ITLS

- Esame dettagliato
- Testa - Piedi
- ricerca di lesioni addominali o altre lesioni non individuate nella valutazione primaria

## RIVALUTAZIONE

Effettuare quando:

- le condizioni del paziente mutano
- dopo aver spostato il paziente
- Dopo un intervento

## >> AZIONI CRITICHE <<

**VALUTAZIONE DELLA SCENA**

1. stabilisci un contatto con la centrale
2. indossa i DPI
3. controlla e gestisci i pericoli
4. richiedi aiuto, se necessario
5. effettua il Triage se ci sono molti pazienti

**VALUTAZIONE INIZIALE**

1. riposiziona il paziente
2. controlla le emorragie (compressione diretta, garza emostatica, tourniquet)
3. libera le vie aeree
4. assisti la ventilazione
5. somministra ossigeno
6. RCP se necessaria
7. estricazione rapida se necessario

**MECCANISMO DI LESIONE**

1. decidi quale valutazione intraprendere in base al MDL e alla valutazione iniziale

**VALUTAZIONE RAPIDA DEL TRAUMA / ESAME FOCALIZZATO**

1. decompressione pneumotorace iperteso
2. medica le ferite sbuffanti del torace
3. Restrizione Motoria Spinale

**Load & Go**

1. trasporto rapido al Trauma Center
2. valutare elisoccorso
3. RMS se indicata
4. comunicazione precisa e tempestiva
5. accesso venoso
6. TXA se indicata
7. monitoraggio
8. rivalutazione / valutazione secondaria

**NON Load & Go**

1. concludi la valutazione secondaria ITLS
2. accesso venoso
3. monitoraggio
4. immobilizzazione / medicazione delle ferite

outsphera for life

ITLS International Trauma Life Support

# VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

## VALUTAZIONE RAPIDA DEL TRAUMA

**TESTA E COLLO**
- Ferite?
- Segni di trauma cranico grave (occhi da procione, Battle)?
- Le vene del collo sono distese?
- C'è deviazione della trachea?

**TORACE**
- Asimmetria (movimenti paradossi), contusioni, ferite penetranti, dolorabilità, instabilità, crepitii
- **Murmure vescicolare** - Presente? Simmetrico? (se asimmetria, percussione)
- **Toni cardiaci** (baseline)

**ADDOME**
- Contusioni, traumi prenetanti / eviscerazioni, dolorabilità, rigidità, distensione

**PELVI**
- Dolorabilità, instabilità, crepitii

**ARTI INFERIORI E SUPERIORI**
- Tumefazioni evidenti e deformità delle cosce
- Polsi, sensibilità e motricità (**PMS**)

**DORSO**
- Ferite evidenti, dolorabilità, tumefazioni, deformità

Se il paziente è critico, trasferire in ambulanza per completare l'esame

Se il polso radiale è presente »

**SEGNI VITALI**
- Frequenza cardiaca e respiratoria, SpO2, pressione arteriosa

**PUPILLE**
- Dimensioni, reattività, simmetria

Se alterazione dello stato mentale » breve esame neurologico »

**GLASGOW COMA SCALE**
- Occhi, voce, movimento